

REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ENDOMETRIYNING BEZLI-KISTOZ GIPERPLAZIYASINI YOSHGA OID SOLISHTIRMA TAHLILI

Xasanova N. L.

Toshkent Davlat Stomatologiya Instituti davolash fakulteti talabasi,
Toshkent Davlat Stomatologiya Instituti Fiziologiya va patologiya kafedrası
Ilmiy rahbar: assistant **Raxmonova Sh. Q.**

Kirish. Endometriyning bezli-kistoz giperplaziyasi — bachadon shilliq qavatining estrogen gormoni ta'sirida haddan tashqari o'sishi va giperplastik o'zgarishi bilan xarakterlanadigan kasallik bo'lib, u reproduktiv yoshdagi ayollarda menstrual tsikl buzilishlari, bedavollik va malignizatsiyaga moyillik bilan namoyon bo'lishi mumkin.

Tadqiqot maqsadi. Reproductive yoshdagi ayollarda endometriyning bezli-kistoz giperplaziyasini yoshga bog'liq ravishda klinik va gistologik tashxislar asosida tahlil qilish.

Materiallar va usullar. Tadqiqot Toshkent shahar patologik anatomiya byurosidadagi operatsion biopsiya materiallarini 2025 yil yanvar oyi davomida to'plangan ma'lumotlar asosida olib borildi. Jami 50 nafar reproduktiv yoshdagi bemorning gistologik tashxislari tahlil qilindi. Bemorlar uchta yosh guruhiga ajratildi:

18-25 yosh — reproduktiv, 26-35 yosh — faol, 36-45 yosh — kechki reproduktiv davr.

Tadqiqot natijalari. Bemorlarning yoshga oid taqsimoti quyidagicha bo'ldi:

18-25 yosh — 10 nafar (20%)

26-35 yosh — 18 nafar (36%)

36-45 yosh — 22 nafar (44%)

Gistologik tashxislar bo'yicha:

Bezli-kistoz giperplaziya — 20 nafar (40%). Eng ko'p 36-45 yosh guruhida kuzatildi.

Bezli giperplaziya — 15 nafar (30%). Asosan 26-35 yoshli ayollarda qayd etildi.

Endometriyning bezli polipi — 8 nafar (16%). Ko'proq 18-25 yosh guruhida uchradi.

Adenomioz va leyomioma — 7 nafar (14%). Asosan 36-45 yosh guruhida uchradi.

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko'ra, endometriyning bezli-kistoz giperplaziyasi eng ko'p 36-45 yoshli ayollarda kuzatildi. 26-35 yoshli ayollarda bezli giperplaziya ustunlik qildi, 18-25 yosh guruhida esa asosan endometriy poliplari va disfunktsional qon ketish holatlari kuzatildi.