

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГИМЕНОЛЕПИДОЗА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Кенжемуратова Айгерим Ернарровна

Медицинский институт Каракалпакстана

Кафедра Инфекционные болезни и дерматовенерология

Научный руководитель - ассистент Тлеумбетова Умитхан Жумамуратовна

Введение. По данным ВОЗ на сегодняшний день гельминтозы занимают 2-место по распространенности после заболеваний дыхательной системы. К настоящему времени установлено, что гименолепидоз распространен повсеместно. Ежегодно в мире им заболевают несколько сотен миллионов человек. Среди заболевших преобладают дети в возрасте от 3 до 9 лет, посещающие детские сады и младшие классы школы. Наибольшее значение имеют такие гельминтозы: как энтеробиоз аскаридоз, трихоцефалез и гименолепидоз. Особое внимание заслуживает редко диагностируемый, но легко передаваемый контактный паразитоз- карликовый цепень (гименолепидоз). Гименолепидоз- гельминтоз человека, вызываемый паразитированием мелкой цестоды — *Hymenolepis nana*, карликового цепня, и протекающий в основном с симптомами поражения желудочно-кишечного тракта. Возбудители гименолепидозов относятся к типу плоских червей, классу ленточных червей, отряду цепней, семейству гименолепидид.

Гименолепидоз – заболевание, передающееся пероральным путем и характеризующееся диспепсическими и астеновегетативными синдромами.

Данный паразит регистрируются на всех территориях Республики Каракалпакстан. Каждый год в Республике Каракалпакстан регистрируются 2-2,2 тыс. случаев инвазии карликовым цепнем, заболеваемость составляет 110-122 на 100 тыс. населения. Заболеваемость детей до 14 лет в 3-3,5 раза больше заболеваемости взрослых.

Цель исследования. Изучение выявления гименолепидоза в разрезе административно-территориальных зон и структуры заболеваемости среди населения Республики Каракалпакстан за каждый год.

Материалы и методы исследования. Официальные данные по паразитарным заболеваниям Республиканского центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, оперативные анализ и статистический методы

Результаты исследования. При анализе статистических данных было замечено, что показатель заболеваемости гименолепидозом по Республике Каракалпакстан был высок в 2015, 2017 и 2018 годах, а самый низкий показатель наблюдался в 2014 году. Заболеваемости гименолепидозом в Республике Каракалпакстан выявлено, что в 2014 году общее число больных составило- 1438 (84,0), в 2015 году общее число больных составило- 1905 (108,0), в 2016 году общее число больных составило- 1825 (102,0), 2017 году общее число больных составило- 2219 (123,0), 2018 году общее число больных составило— 2030 (110,2). При изучении заболеваемости гименолепидозом в разрезе административно-территориальных зон Республики Каракалпакстан с 2014 по 2018 года, наиболее высокие показатели наблюдались в Нукусе, Турткуле и Тахтакупыре.

Структуры заболеваемости гименолепидозом в Республике Каракалпакстан выявлено, что в 2014 году общее число больных составило- 1438, из них 986 (68,5%) дети до 14 лет, в 2015 году общее число больных составило- 1905, из них 1289 (67,6%) дети до 14 лет, в 2016 году общее число больных составило- 1825, из них 1535 (84,1%) дети до 14 лет, 2017 году общее число больных составило- 2219, из них 1906 (85,8%) дети до 14 лет, 2018 году общее число больных составило— 2030, из них 1688 (83,6%) дети до 14 лет.

Выводы. Гименолепидоз остается одним из широко распространенных в Республики Каракалпакстан гельминтозов, который сопровождается нарушением функций всех систем органов человека, нарушением иммунитета и является причиной возникновения хронических заболеваний среди населения.

Когда речь идет о гименолепидозе надо подчеркнуть то что, своевременное проведение санитарно-гигиенических мероприятий как повышение культуры личной гигиены, проведение санитарных уборок в туалетных помещениях, выявление и контроль за

больными гименолепидозом, проведение санитарно-просветительской работы среди родителей и работников детских учреждений, а также профилактические обследования коллективов и обслуживающего персонала, контингентов работников питания, водоснабжения и торговли – являются способами профилактики данного заболевания.