

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КОРИ У ВЗРОСЛЫХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Охунжонова К.Х.

Студентка первого лечебного факультета Ташкентской Медицинской Академии

Кафедра инфекционных болезней Ташкентской Медицинской Академии

Научный руководитель – Доктор Медицинских Наук, доцент

Рахматуллаева Ш.Б.

Введение. Корь остаётся серьёзной проблемой общественного здравоохранения, особенно в странах с низким уровнем охвата вакцинацией. В последние годы наблюдается рост заболеваемости корью, в том числе среди взрослых, что связано с отказами от вакцинации и отсутствием иммунитета.

Цель исследования. Изучить клинические и лабораторные особенности течения кори у взрослых и выявить отличия по сравнению с течением заболевания у детей.

Материалы и методы. Обследованы 208 пациентов с диагнозом корь (152 взрослых и 56 детей). Использовались клинические, серологические и статистические методы анализа. Уровень специфических антител к кори определяли с помощью метода ИФА.

Результаты. У взрослых корь протекает тяжелее, чем у детей: доля тяжёлых форм среди взрослых составила 13,1% (против 8,9% у детей). Лёгкие формы кори у взрослых встречались реже — 5,9% (против 35,7% у детей). У взрослых наблюдались более выраженные признаки интоксикации и лихорадочная реакция. Осложнения, такие как бронхит, были более частыми (в 69,7% случаев). В катаральной стадии у взрослых симптомы были менее выражены, однако в стадии сыпи различия сглаживались. У значительной части взрослых (60%) отсутствовали подтверждённые данные о вакцинации, что затрудняло оценку влияния прививок.

Выводы. Корь у взрослых сохраняет типичную симптоматику, но характеризуется более тяжёлым течением и большей частотой осложнений по сравнению с детьми. Диагностика основывается на клинической картине, эпидемиологическом анамнезе и лабораторных исследованиях. Вакцинация остаётся важной мерой профилактики, однако низкий охват вакцинацией увеличивает риск распространения инфекции.