

АНАЛИЗЫ ПАЦИЕНТОВ, ОБРАТИВШИХСЯ В ЦЕНТР АЛЛЕРГОЛОГИИ С ЛЕКАРСТВЕННОЙ АЛЛЕРГИЕЙ

Хусанова Ширинабону Эргаш кизи

Стуентка лечебного факультета No 2 Ташкентской медицинской академии

Кафедра аллергологии, клинической иммунологии и сестринского дела

Ташкентской медицинской академии

Научный руководитель- ассистент **Алимова Н.Н.**

Введение. Согласно данным различных специалистов, у 10–20% людей, принимающих лекарственные препараты, наблюдаются осложнения, вызванные этими веществами. По данным Всемирной организации здравоохранения, из 1000 пациентов, обратившихся в больницу, 50 направляются туда из-за осложнений, вызванных лекарственными препаратами. В Соединенных Штатах Америки примерно у 30% пациентов, проходящих лечение в стационаре, наблюдаются побочные реакции на какое-либо лекарственное средство. В нашей республике среди взрослых аллергия, вызванная лекарственными препаратами, встречается в среднем у 2 из 1000 человек. Побочные эффекты лекарственных средств фиксируются у 8% пациентов, проходящих стационарное лечение, и у 1,5% пациентов, лечащихся амбулаторно. Среди лиц, прошедших профилактическую вакцинацию, у 13% выявлено сывороточное заболевание. Анафилактический шок наблюдается у одного из 50 тысяч пациентов, принимающих лекарственные препараты. У медицинских работников лекарственная аллергия встречается в 10 раз чаще, чем у представителей других профессий.

Цель исследования. Данное исследование было проведено с целью анализа пациентов, обратившихся в специализированный центр аллергологии нашей страны с диагнозом «лекарственная аллергия».

Материалы и методы. В 2024 году был проведен ретроспективный анализ медицинских карт 289 пациентов, проходивших стационарное лечение, и 2870 пациентов, получавших амбулаторное лечение в Республиканском специализированном научном центре аллергологии с диагнозом «лекарственная аллергия». Был изучен процент пациентов, обратившихся с диагнозом лекарственной аллергии, а также проанализированы лекарственные средства, вызвавшие аллергические реакции.

Результаты исследования. Согласно результатам анализа, в 2024 году в центре 289 пациентов с диагнозом «лекарственная аллергия» проходили стационарное лечение, что составило 8,6% от общего числа стационарных пациентов (всего 3362 пациента). Амбулаторную помощь по поводу лекарственной аллергии получили 2870 пациентов, что составило 74,3% от общего количества амбулаторных больных (всего 3864 пациента). Наиболее частыми группами лекарственных средств, вызывающими аллергические реакции, оказались антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты, противосудорожные средства, нейролептики и другие. У 172 из 289 пациентов (59%), проходивших стационарное лечение, аллергическая реакция была вызвана антибиотиками, преимущественно ампициллином (амоксиксиклином) и антибиотиками из группы цефалоспоринов (цефтриаксон, цефоперазон). В 32 (11%) случаях среди стационарных пациентов и в 260 (9%) случаях среди амбулаторных пациентов не удалось установить, на какое именно лекарственное средство возникла аллергическая реакция.

Выводы. Лекарственная аллергия по-прежнему занимает одно из ведущих мест среди аллергических заболеваний в нашей стране. Высокая частота случаев

лекарственной аллергии обусловлена бесконтрольным применением лекарственных средств без назначения врача, их неправильным использованием, а также полипрагмазией. Тяжелые, жизнеугрожающие реакции чаще всего связаны с применением парентеральных антибиотиков в амбулаторных условиях без врачебного контроля, и такие случаи до сих пор встречаются довольно часто. Среди пациентов, обратившихся в центр аллергологии с диагнозом «лекарственная аллергия» и проходивших лечение, наибольшее количество случаев было вызвано антибиотиками. Другими группами лекарственных средств, провоцирующими аллергические реакции, являлись нейролептики, нестероидные противовоспалительные препараты и противосудорожные средства.